

# Numerisches Programmieren, Übungen

## 12. Übungsblatt: Iterative Verfahren II

### 1) Kondition eines Eigenwertproblems

- i) Finden Sie alle Eigenwerte  $\lambda_i(\varepsilon)$  und Eigenvektoren  $v_i(\varepsilon)$  der Matrix

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 + \varepsilon \cos(2/\varepsilon) & -\varepsilon \sin(2/\varepsilon) \\ -\varepsilon \sin(2/\varepsilon) & 1 - \varepsilon \cos(2/\varepsilon) \end{pmatrix}.$$

- ii) Wie verhalten sich  $A(\varepsilon)$ ,  $\lambda_i(\varepsilon)$ , und  $v_i(\varepsilon)$  für  $\varepsilon \rightarrow 0$ ? Ist das Eigenwert- bzw. Eigenvektorproblem für kleine  $\varepsilon$  gut konditioniert?

### 2) Satz von Gerschgorin

- i) Beweisen Sie den *Satz von Gerschgorin*:

Sei  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  eine quadratische Matrix mit Einträgen  $a_{ij}$ . Dann liegt jeder Eigenwert  $\lambda$  von  $A$  in mindestens einer der Kreisscheiben  $K_j$ , die durch

$$K_j := \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{jj}| \leq \sum_{k=1, k \neq j}^n |a_{jk}| \right\}, \quad j = 1, \dots, n,$$

definiert sind.

*Hinweis:* Betrachten Sie die  $j$ te Komponente der Eigenwertgleichung  $Ax = \lambda x$ , wobei  $x_j$  der maximale Eintrag von  $x$  ist.

- ii) Zeichnen Sie für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

die Gerschgorin-Kreise und finden Sie eine obere Schranke für die Kondition  $\kappa_2(A)$ . Hinweis: Benutzen Sie die Euklidische Norm.

### 3) Rayleigh Quotient

- i) Sei  $x \in \mathbb{R}^n$  Eigenvektor einer Matrix  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . Zeigen Sie, dass die zugehörigen Eigenwerte  $\lambda$  mit Hilfe des Rayleigh Quotienten berechnet werden können:

$$\lambda = \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

- ii) Sei  $\lambda_{\min}$  und  $\lambda_{\max}$  der kleinste bzw. größte Eigenwert einer symmetrischen Matrix  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . Zeigen Sie, dass folgende Zusammenhänge gelten:

$$\lambda_{\min} = \min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}, \quad \lambda_{\max} = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

Hinweis: Wegen

$$\lambda_{\min} = \min_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x} = \min_{x \neq 0} \left( \frac{1}{\|x\|_2} x \right)^T A \left( \frac{1}{\|x\|_2} x \right) = \min_{\|y\|_2=1} y^T A y$$

ist es ausreichend, folgende Zusammenhänge zu zeigen:

$$\lambda_{\min} = \min_{\|x\|_2=1} x^T A x \quad \text{and} \quad \lambda_{\max} = \max_{\|x\|_2=1} x^T A x.$$

### 4) Iterationsverfahren

- i) Berechnen Sie analytisch alle Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ .
- ii) Führen Sie zwei Iteration der direkten Vektoriteration (power iteration) für  $A$
- ohne Shift,
  - mit Shift  $\mu = 1.5$  und
  - mit Shift  $\mu = 3.5$

durch und berechnen Sie die zugehörige Eigenwertapproximation. Benutzen Sie dazu  $x_0 = (1, 0)^T$  als Startvektor. Gegen welchen Eigenwert konvergiert die Iteration? Wie ist die Konvergenzrate für den jeweiligen Fall?

- iii) Für welchen Shift  $\mu$  konvergiert die direkte Vektoriteration (power iteration) gegen den ersten bzw. zweiten Eigenwert von  $A$ ? Was passiert, falls  $\mu = 3$  gewählt wird?